

3 โรคอันตราย เกิดขึ้นได้จาก “ยุงลาย”

หลายคนอาจจะรู้ว่า ยุงลาย เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก แต่แท้จริงแล้ว ยังมีโรคอื่นๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะด้วยเช่นกัน

1 โรคไข้เลือดออก

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกี ซึ่งมี 4 สายพันธุ์ ดังนั้นคนจึงสามารถเป็นได้มากกว่า 1 ครั้ง และถ้าติดเชื้อครั้งที่ 2 อาการจะรุนแรงกว่าครั้งแรก

ยุงลายบ้านและยุงลายสวน มีลายสีดำสลับขาว ตามลำตัวและขา และมีกอกหักทึบในเวลากลางวัน

ใช้สเปรย์ไล่ยุงลาย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บตามข้อต่อ

2 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

หรือโรคชิคุนกุนยา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา จะมีอาการปวดข้อมาก ซึ่งอาจเป็นเรื้อรังได้นานเป็นปี

ปวดข้อ มีไข้ มีผื่น

3 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา อาการจะไม่รุนแรงในผู้ป่วยทั่วไป แต่หากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ บางรายอาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด เด็กมีพัฒนาการช้า

มีผื่น ตาแดง มีข้ออักเสบ

DDC กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กองโรคติดต่อทางแมลง
Division of Vector Borne Diseases

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422