

RSV

ไวรัสตัวร้าย

ทำไมเด็กถึงติดกันเยอะ ?

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี พบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการรุนแรง คือ เด็กเล็ก เด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง เด็กที่คลอดก่อนกำหนด ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง



การติดต่อ

ไอ จาม ทานอาหาร หรือ สัมผัสสิ่งของร่วมกัน

เชื้อไวรัส RSV พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน - ฤดูหนาว

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียารักษา เชื้อไวรัส RSV ให้รักษาตามอาการ

ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอละลายเสมหะ

อาการ

ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ หลังติดเชื้อประมาณ 4 – 6 วัน



มีไข้



ไอ เจ็บคอ



มีน้ำมูก

อาการรุนแรง : หายใจเร็ว หายใจหอบ หายใจมีเสียงหวีด เสียงครืดคราดในลำคอ เบื่ออาหาร เชื้อซึม

หมายเหตุ : หากมีอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันที

การป้องกัน



หมั่นล้างมือ ด้วยน้ำสบู่บ่อย ๆ



หลีกเลี่ยงการสัมผัส ใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย และการไปสถานที่แออัด



ทำความสะอาดของใช้ ของเล่น และซักเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ



รักษาสุขอนามัย และไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน

DDC กรมควบคุมโรค Department of Disease Control

กองควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

สายด่วน 1422

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565