

1ไข้เลือดออก
อันตรายหน้าฝน
มหันตภัยร้ายจากยุงลาย

กระทรวงสาธารณสุข

ระยะแรก **ระยะวิกฤต** **ระยะฟื้นตัว**

มีไข้สูง อาจปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ มีผื่น บางคน อาจจะมีเบื่ออาหาร และมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน

ระยะนี้ต้องระวังมากที่สุด
เพลียและซึม ชี้ออกน้อย ปวดท้อง เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด หรืออุจจาระเป็นสีดำ ในระยะนี้**ไข้จะลดลง มือเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้ช็อกจนเสียชีวิต**

นี้ออกมากขึ้น อยากอาหารมากขึ้น ปวดท้อง หรือท้องอืดลดลง

ที่สำคัญ ! ควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการช็อก หากมีไข้ต่อเนื่อง 3 วัน หรือมีอาการรุนแรงขึ้น ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน

ป้องกันไม่ให้ยุงกัด ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์

สวมน้ำยากันยุง
สื้ออ่อน
เพราะเสื้อกันยุงช่วยลดแสง และมีกลิ่นที่ยุงกลัวว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ยุงชอบ

ทายากันยุง
สเปรย์กันยุง

ใช้อุปกรณ์
ไล่ยุง
เครื่องไล่ยุง ไม้ชิงชัน สัตว์ก่อกวนยุง

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
โดยยึดหลัก 3 เก็บ
ป้องกัน 3 โรค

เก็บบ้าน
เก็บขยะ
เก็บน้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์บริการโลหิต ณ ชั้น 2 อาคาร 10 ชั้น 10 ถนนสุรนทรี อำเภอเมืองนครราชสีมา 30000
☎ 0-4421-22000 ต่อ 305 ☎ 0-4421-8888

1422
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ