

เขียนโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019 เวลา 08:20 น.

ยาแก้ปวด ทำหัวใจพัง ยิ่งหายใจ ยิ่งอันตราย

อย่าแก้ปวดก้ำหัวใจผิด

ยิ่งหายเร็ว ยิ่งอันตราย

"ถ้าปวดจากอาการทางกระเพาะอาหาร และคิดว่าหัวใจ มีปัญหาต้องรีบไปหาแพทย์
เพื่อรีบตรวจหัวใจให้ถูกต้องถูกต้น ถ้าพิจารณา ผิดๆจนเกินไป โดยเฉพาะ
ถ้าไปแก้ที่หลอดเลือดหัวใจให้ไหลเวียนไม่ดี"

สาเหตุปวดหัวใจ NSTEMI และ Angina มีลักษณะ

มีลักษณะคล้ายกับอาการหัวใจขาดเลือด

Dichloride (ยี่ห้อ Voltaren)	Europan (ยี่ห้อ Europan)	Negason (ยี่ห้อ Négason)
Meloxicam (ยี่ห้อ Melax)	Flexodon (ยี่ห้อ Flexodon)	Sulindac (ยี่ห้อ Clinac)

Phenybutazone Meloxicam: อย.ศบ (ยี่ห้อ Ponsent)

สาเหตุปวดหัวใจ NSTEMI และ Angina มีลักษณะ

มีลักษณะคล้ายกับอาการหัวใจขาดเลือด

Celecoxib (ยี่ห้อ Celebra)	Etoricoxib (ยี่ห้อ Arcoxia)
----------------------------	-----------------------------

ทั้งสาม

- ใช้ยานี้ปวดบวมขึ้นตามร่างกาย
- หากขาดยาจะเกิดอาการแทรกซ้อน
- อาจมีผล
- ตามปกติของหัวใจ ปวดหัว ปวดท้อง ปวดข้อ
- หากมีอาการปวดหัว ปวดท้อง ปวดข้อ ปวดตามร่างกาย
- ผู้ป่วยโรคหัวใจประจำตัว ต้องใช้ยาตามแพทย์สั่ง
- หรือมีอาการปวดตามร่างกาย

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้า

โทรมาขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อทางศูนย์
www.chulalongkornhospital.go.th
 Tel : 02-254-4000

Facebook: chulalongkornhospital

 chulalongkorn