

ควันบุหรี่ ตัวอันตราย

ภัยร้ายสำหรับเด็กทารก



ควันบุหรี่มือหนึ่ง
ควันบุหรี่ที่
ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไป
ร่างกายของ

ประเภทของควันบุหรี่



ควันบุหรี่มือสอง



ควันบุหรี่ที่
ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไป
ร่างกายของ



ควันบุหรี่มือสาม
อณูขนาดเล็กของสารพิษ
จากควันบุหรี่ที่
ตกค้างตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ทุกปีจะมีคนเสียชีวิตจากบุหรี่ถึง 48,244 คน

สารพิษ
ในควันบุหรี่

สารก่อมะเร็ง, นิโคติน, สารหนู,
ตะกั่ว และสารไฮยาไนด์



ภัยร้ายที่เรียกว่า ควันบุหรี่



ควันบุหรี่มือสอง
มีอันตราย
ถึง 48 ชั่วโมง



เด็กทารกที่ได้รับควันบุหรี่
มีอัตราการเสียชีวิต
ถึง 20 เท่า



การสูดดมควันบุหรี่มือสอง
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ทางเดินหายใจถึง 20 - 40%



การสูดดมควันบุหรี่มือสอง
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ทางเดินหายใจถึง 20 - 40%



การสูดดมควันบุหรี่มือสอง
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ทางเดินหายใจถึง 20 - 40%



การสูดดมควันบุหรี่มือสอง
เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ทางเดินหายใจถึง 20 - 40%

43,800 คนเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสอง
ได้รับนิโคตินและสารพิษจากควันบุหรี่มือสอง

1 / 1