

วิธีรักษาอาการของลูกที่สำคัญของติดคอ

ลูกสำคัญของติดคอ

รักษาได้อย่างไร



1. เรียกหาผู้ใหญ่ช่วย
กรณีเหตุการณ์ / คนอยู่ ต้องทำการกู้ชีพทันที
กรณีญาติติดใจ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาล



2. ยึดรอกหายใจของสิ่งแปลกปลอม เช่น
• เอกซเรย์ปอด เพื่อระบุตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม
ซึ่งจะมองเห็นในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่หลอด
เช่น หลอดลม
• เอกซเรย์ก่อนผ่าตัด กรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมไม่สัมพันธ์กับรังสี
เช่น ปลาหมึก หรือกระดูกซี่โครง



3. ยึดรอกหายใจของสิ่งแปลกปลอมออกจาก
ช่องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเด็กเล็ก
ยังมีความยากในการรักษา

หากถูกห้ามไว้ หรือสงสัยว่าเด็กมีสิ่งแปลกปลอมติดคอ
หากมีอาการเหล่านี้ควรส่งแพทย์ทันที

- เสียงหายใจหืด
- หายใจลำบาก
- เด็กมีอาการเหนื่อย
- เด็กมีอาการงอแง



ที่มา : อ. นพ.วิรัตน์ ศรีประเสริฐ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลไทย
www.chulalongkornhospital.go.th

Facebook: chulalongkornhospital
Twitter: chulalongkornhospital
Instagram: chulalongkornhospital
LINE: chulalongkornhospital

02-254-4000 ต่อ 0