

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ“เอดส์”

❓ เชไอวีกับเอดส์ ต่างกันอย่างไร

- **เชไอวี** เป็นชื่อเชื้อไวรัส
- **เอดส์** เป็นชื่อระยะท้ายของการติดเชื้อเชไอวี ผู้ที่ติดเชื้อเชไอวีทุกคน**ไม่ได้เป็นเอดส์**

👤 การติดต่อ

การติดต่อ ที่พบบ่อยที่สุด คือ ทางเพศสัมพันธ์ทางอื่น ๆ ได้แก่ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก

👤 อาการของผู้ติดเชื้อ

แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะติดเชื้อเฉียบพลัน

อาการคล้ายไข้หวัด

ระยะไม่มีอาการ

หลังจากหายจากระยะแรก

ระยะมีอาการ

เช่น น้ำหนักลด ไข้เรื้อรัง
ท้องเสียเรื้อรัง

ระยะเอดส์

ภูมิคุ้มกันต่ำมาก หรือ
มีโรคติดเชื้อแทรกซ้อน
เช่น วัณโรค

🏥 การรักษา

กินยาทุกวันตลอดชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตและอายุยืนใกล้เคียงคนทั่วไป ส่วนการรักษาที่ท้าทายมาก ยังอยู่ในการวิจัย

🛡️ วิธีป้องกัน

ใช้ถุงยางอนามัย

กินยาดับเชไอวี

ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

ในหญิงตั้งครรภ์ตรวจเลือดและเข้าสู่อำนาจรักษาหากติดเชื้อ

LINE Ramathibodi

RAMA
CHANNEL
#เชไอวีเอดส์42

ศ. พญ. กชิตาภรณ์ เกษมสันต์กุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
<https://www.rama.ramathibodi.ac.th/th/igmp/42>

1 / 1